

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE DE UTILIZARE




Rapid

Pentru o eficacitate maximă, pastila de a doua zi trebuie administrată cât de repede posibil după ce metoda contraceptivă obișnuită a eșuat. Se recomandă administrarea pastilei cu o cantitate suficientă de lichid.




Vărsături

În cazuri rare survin vărsături după administrarea pastilei. Dacă în decurs de 3 ore de la administrare survin vărsături, este necesară administrarea unei noi pastile de a doua zi.




Menstruație întârziată

Administrarea pastilei de a doua zi poate întârzia menstruația cu câteva zile. Puteți efectua un test de sarcină pentru a verifica siguranța administrării la timp a pastilei de a doua zi și a efectului acesteia.



Sex după pastila de a doua zi

Pastila de a doua zi nu asigură protecție contraceptivă pentru restul ciclului menstrual. În cazul în care metoda contraceptivă obișnuită eșuează din nou, consultați din nou farmacistul referitor la administrarea unei pastile de a doua zi.



Pilulă contra- ceptivă

Dacă pastila de a doua zi este luată din greșeală: Luați în continuare pilula dumneavoastră contraceptivă la ora obișnuită – chiar și dacă pastila de a doua zi a fost administrată în aceeași zi. Până la următoarea menstruație, trebuie să folosiți suplimentar prezervativul ca metodă de contracepție. În cazul în care luați pilula contraceptivă pe termen lung, trebuie să utilizați și prezervativul timp de cel puțin 14 zile.

INFORMAȚII DE BAZĂ

Cum acționează pastila de a doua zi?

Pastila de a doua zi poate amâna ovulația cu cel puțin 5 zile, dacă aceasta încă nu a avut loc. Astfel, ovulația are loc abia atunci când spermatozoizii nu mai sunt fertili. Așadar, spermatozoizii și ovulul nu se mai pot întâlni. Apariția unei sarcini este imposibilă.

Ovulația nu este predictibilă!

Cea mai mare probabilitate de apariție a unei sarcini este în cele două zile înainte de ovulație. Totuși, momentul ovulației nu este predictibil. Aceasta poate apărea la începutul, la mijlocul sau la sfârșitul perioadei menstruale și variază foarte mult de la femeie la femeie. Din acest motiv, fiecare oră contează pentru administrarea pastilei de a doua zi.

Preveniți ovulația cât mai repede!

Pentru a preveni ovulația, pastila de a doua zi trebuie administrată cât mai repede posibil după raportul sexual neprotejat! În cazul în care ovulația a avut deja loc, pastila de a doua zi nu mai este eficientă – apariția sarcinii este posibilă. Pastila de a doua zi nu întrerupe o sarcină existentă.

Informații suplimentare despre pastila de a doua zi sunt disponibile pe www.pille-danach.de